

# OXA B<sub>12</sub>

Comprimidos - Inyectable



Urufarma

LI-4793-04

## Fórmula:

**OXA B<sub>12</sub>** Comprimidos recubiertos Cada comprimido contiene: Betametasona 0,3 mg; Cianocobalamina 5000 mcg, Diclofenac Potásico 50,0 mg y excipientes c.s.

**OXA B<sub>12</sub>** inyectable. Cada frasco ampolla liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 10000 mcg y excipientes c.s.

Cada ampolla contiene: Betametasona (como 21 fosfato disódico) 2 mg; Diclofenac Potásico 75 mg y excipientes c.s.p. 3 mL.

## Propiedades

**OXA B<sub>12</sub>** es una asociación constituida por Diclofenac, Betametasona y Vitamina B<sub>12</sub> destinada al tratamiento de las afecciones dolorosas e inflamatorias con componente neurítico y artropatías agudas y/o crónicas. El Diclofenac Potásico es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo con excelentes propiedades antirreumáticas, analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas debidas a su acción inhibitoria de la síntesis de prostaglandinas. La Betametasona es una droga antiinflamatoria por excelencia que tiene la propiedad de inhibir todo tipo de inflamación. La Vitamina B<sub>12</sub> interviene en una serie de procesos metabólicos de gran valor en el mecanismo de conducción nerviosa y es por lo tanto de utilidad excepcional en el tratamiento de neuritis y en otros tipos de procesos inflamatorios articulares.

**Indicaciones:** Afecciones neuríticas de origen traumático. -Radiculitis, Neuralgias, Lumbociatalgias y Cervicobraquialgias. -Dolor músculo esqueléticos y reumáticos extraarticulares. -Periartritis escápulo humeral, Tenosinovitis, Miositis y Bursitis, Epicondilitis, Tortícolis, Esguinces. -Patologías del deportista y Patologías laborales, Fibrositis.

## Posología

**OXA B<sub>12</sub>** Comprimidos recubiertos 1 comprimido cada 8 o 12 horas según criterio médico, administrados preferentemente después de las comidas.

**OXA B<sub>12</sub>** Inyectable 1 o 2 frascos ampolla por día, exclusivamente por vía intramuscular profunda.

**Reacciones secundarias:** En los comprimidos ocasionalmente puede aparecer epigastralgia, náuseas y vómitos. En el inyectable puede aparecer dolor en el sitio de inyección.

## Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los principios activos. Úlcera gastroduodenal activa, hipertensión arterial severa, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia hepática o renal graves, tuberculosis activa. La experiencia actual no permite establecer la inocuidad de su uso durante el embarazo, por lo tanto sólo deberá utilizarse cuando a criterio del médico el beneficio supere los riesgos posibles.

## Precauciones y advertencias

Usar con precaución en pacientes con antecedentes de hemorragia digestiva, úlcera gastroduodenal, hipertensión arterial, hipercorticismo, infecciones bacterianas crónicas, micosis sistémicas, diabetes, herpes zoster y otras virosis cutáneas. En tratamientos prolongados debe controlarse el hemograma, el metabolismo óseo y la función suprarrenal. Se deberá evitar su empleo en pacientes con glaucoma, cataratas o con artritis sépticas.

## Presentaciones

**OXA B<sub>12</sub>** comprimidos recubiertos: Envase conteniendo 10 comprimidos recubiertos.

**OXA B<sub>12</sub>** inyectable: Envase conteniendo 3 frascos ampolla liofilizado + 3 ampollas.

**Nota:** Para reconstituir el liofilizado usar únicamente el contenido de la ampolla que se adjunta.

Conservar a temperatura ambiente.

En caso de sobredosisificación comunicarse con el CIAT. Tel.: (02)1722.

Mantener fuera del alcance de los niños.



URUFARMA S.A.

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: [depto\\_medico@urufarma.com.uy](mailto:depto_medico@urufarma.com.uy)

Pág. Web: [www.urufarma.com.uy](http://www.urufarma.com.uy)