

Terfin®

Terfin

Clorhidrato de Terbinafina 1%



Urufarma

LI-5720-04

Crema

Fórmula: Cada 100 g de crema contiene:
Clorhidrato de Terbinafina 1 g y excipientes c.s.



Acción Terapéutica:
Antimicótico.

Indicaciones:
Infecciones fúngicas de la piel causadas por dermatofitos.
Infecciones cutáneas por levaduras, principalmente las causadas por el género Candida (por ejemplo C. albicans).
Pitiriasis (Tinea) versicolor.

Posología y forma de administración:

Adultos y niños mayores de 12 años: antes de aplicar **Terfin®** crema, deberá lavar el área afectada con agua y jabón. Luego seque cuidadosamente. Aplicar una o dos veces por día en la lesión y zona circundante. Para el pie de atleta (micosis de los pies), aplique con especial atención en los espacios entre los dedos, dos veces por día. Se recomienda cambiar las medias diariamente y antes de colocarse el calzado asegurarse que el interior esté seco.
Lave las manos después de cada aplicación.

La duración del tratamiento, siempre y cuando su uso sea regular e ininterrumpido, es de una semana en el caso de Tinea corporis/cruris, Tinea pedis (tipo interdigital) y Candidiasis cutánea. En el caso de Pitiriasis versicolor, la duración del tratamiento es de 2 semanas.

Si los síntomas persisten o empeoran luego de la semana de tratamiento, consulte a su médico.

Advertencias y Precauciones:

- Sólo para uso externo.
- Si existe irritación cutánea o alergia, suspenda el tratamiento y consulte a su médico.
- No aplicar en cuero cabelludo, boca, ojos, ni infecciones vaginales.
- No aplicar sobre lesiones en donde el alcohol pueda ser irritante.
- Embarazo, no administrar salvo bajo expresa prescripción médica.
- Lactancia, Terbinafina pasa a la leche materna por lo que las madres lactantes no deberían ser tratadas con Terbinafina. Debe evitarse que los niños lactantes entren en contacto con alguna zona de la piel tratada con Terbinafina, incluido el pecho.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida a la Terbinafina o a cualquiera de los componentes de la fórmula. Lactancia.

Presentación: Envases conteniendo 15 g.
Conservar a temperatura ambiente (15-30) °C.

En caso de intoxicación comunicarse con el CIAT. Tel.: (02)1722.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta libre en condiciones reglamentarias.

Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas consulte a su médico.

Representante del Laboratorio Elea S.A.C.I.F y A.



URUFARMA S.A.

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: depto_medico@urufarma.com.uy

Pág. Web: www.urufarma.com.uy