



Roxaban



COMPOSICIÓN

Roxaban 10 mg:

Cada comprimido recubierto contiene rivaroxabán 10 mg y excipientes (p.s.p.)

Roxaban 15 mg:

Cada comprimido recubierto contiene rivaroxabán 15 mg y excipientes (p.s.p.)

Roxaban 20 mg:

Cada comprimido recubierto contiene rivaroxabán 20 mg y excipientes (p.s.p.)

ACCIÓN

Roxaban 10 mg

Indicado para la prevención del tromboembolismo venoso (TEV, formación de coágulos sanguíneos en las venas) en pacientes sometidos a cirugía de reemplazo de cadera o rodilla. Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar (EP), y prevención de la recurrencia de la TVP y la EP en adultos.

Roxaban 15 y 20 mg

Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar (EP), y prevención de la recurrencia de la TVP y la EP en adultos. Prevención del accidente cerebrovascular y la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular con uno o más factores de riesgo como insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, edad >75 años, diabetes mellitus, accidente cerebrovascular previo o ataque isquémico transitorio.

DOSIFICACIÓN

Los comprimidos que contienen comprimidos de 15 mg y 20 mg deben tomarse con las comidas, mientras que los que contienen 10 mg se pueden tomar con o sin alimentos.

Trombosis venosa profunda aguda y/o embolia pulmonar: Tratamiento inicial de 15 mg por vía oral, dos veces al día con alimentos, durante 21 días. Después de este período de tratamiento inicial, la dosis recomendada de rivaroxabán es de 20 mg por vía oral, una vez al día con alimentos, aproximadamente a la misma hora todos los días.

Reducción del riesgo de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar: La dosis recomendada es de 20 mg por vía oral, una vez al día, con alimentos, aproximadamente a la misma hora.

Prevención de la trombosis venosa después de la cirugía de reemplazo de cadera o rodilla: La dosis recomendada es de 10 mg por vía oral, una vez al día, con o sin alimentos. La dosis inicial debe administrarse de 6 a 10 horas después de que se haya detenido el sangrado después de la cirugía.

Se recomienda un tratamiento de 35 días para los pacientes sometidos a cirugía de cadera. Para los pacientes sometidos a cirugía de rodilla, se recomienda un tratamiento de 12 días.

PRESENTACIÓN

Roxaban 10 mg: Envases que contienen 10 comprimidos recubiertos

Roxaban 15 mg: Envases que contienen 7, 14 y 28 comprimidos recubiertos

Roxaban 20 mg: Envases que contienen 7, 14 y 28 comprimidos recubiertos