



Sulatan



COMPOSICIÓN

Cada cápsula pequeña contiene: Aprepitant 80 mg y excipientes (c.s.p.)
Cada cápsula grande contiene: Aprepitant 125 mg y excipientes (c.s.p.)

ACCIÓN

Este medicamento está indicado para adultos y adolescentes a partir de los 12 años, combinado con otros medicamentos para tratar las náuseas y los vómitos causados por algunos tratamientos de quimioterapia tales como: cisplatino, ciclofosfamida, doxorubicina o epirubicina.

DOSIFICACIÓN

Tome Sulatan por vía oral, con o sin alimentos. La cápsula debe tragarse entera. Tome siempre Sulatan junto con otros medicamentos para prevenir las náuseas y los vómitos, incluidos los corticosteroides (por ejemplo, dexametasona) y un antagonista de 5-HT₃ (por ejemplo, un ondansetrón). La duración recomendada del tratamiento es de 3 días. El primer día, tomar 1 cápsula de 125 mg (cápsula grande), 1 hora antes del inicio de la sesión de quimioterapia. En los dos días siguientes, tome 1 cápsula de 80 mg (cápsula pequeña) todos los días, 1 hora antes de comenzar la sesión de quimioterapia. Si no está recibiendo quimioterapia tome Sulatan por la mañana. No tome más de lo que lo recetado por su médico. Si se olvida una dosis consultar al médico

PRESENTACIÓN

Cada envase contiene 3 cápsulas (2 cápsulas pequeñas y 1 cápsula grande)