

# Secufem Plus

Levonorgestrel 1,5 mg.



LI-3764-04

## Fórmula:

Cada comprimido contiene: Levonorgestrel 1,50 mg y excipientes c.s.

## Acción terapéutica:

Anticonceptivo oral de emergencia.

## Indicaciones:

Prevención del embarazo luego de una relación sexual sin protección.

## Acción farmacológica:

Ovulostático. Modifica las condiciones del endometrio.

## Posología y modo de administración:

El comprimido de SECUFEM PLUS se deberá ingerir con un vaso de agua lo antes posible, preferiblemente dentro de las 12 horas, y no más tarde de las 72 horas después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección.

Este medicamento puede administrarse en cualquier momento del ciclo sexual.

Luego de la utilización de este método de emergencia, se recomienda usar un método anticonceptivo de barrera (preservativo) hasta la aparición de la próxima menstruación.

Si utilizó SECUFEM PLUS durante un tratamiento con anticonceptivos orales debe continuar este último de la manera habitual hasta finalizarlos.

En caso de vómitos dentro de las tres horas siguientes a la toma del comprimido, debe tomarse otro comprimido inmediatamente.

Se recomienda a las mujeres que han utilizado medicamentos inductores de enzimas durante las últimas 4 semanas, y que necesitan una anticoncepción de emergencia, que utilicen un anticonceptivo de emergencia no hormonal, es decir un DIU-Cu, o que tomen una dosis doble de Levonorgestrel (es decir, 2 comprimidos a la vez) si no pueden o no desean utilizar el DIU-Cu.

## Contraindicaciones:

Embarazo conocido o sospechado.

Antecedentes tromboembólicos y tromboflebitis.

Enfermedad cardiovascular o vascular encefálica.

Dislipidemias.

Cáncer genital o mamario confirmado o sospechado y otros tumores hormonodependientes.

Sangrado vaginal de etiología no determinada.

Ictericia.

Prurito generalizado.

Herpes u otosclerosis de presentación o agravados por el embarazo.

Síndrome de Dubin-Johnson o Rotor.

Enfermedad hepática severa y antecedentes de la misma.

Porfiria.

## Precauciones y advertencias:

La anticoncepción de emergencia debe ser utilizada cuando el médico lo considere necesario. Deben considerarse las siguientes situaciones:

- La sobredosis que se administra no es deseable en un tratamiento habitual.

- Este método no reemplaza a la anticoncepción oral tradicional.

SECUFEM PLUS no debe utilizarse en conjunción con anticonceptivos de urgencia que contienen acetato de Ulipristal.

Su utilización no está recomendada en pacientes con insuficiencia hepática grave.

Los síndromes graves de malabsorción, como la enfermedad de Crohn, pueden disminuir la eficacia de SECUFEM PLUS.

El sangrado menstrual siguiente a la toma de SECUFEM PLUS aparecerá en la fecha prevista. Sin embargo, es posible que pueda suceder un adelanto o un retraso de algunos días. En aquellos casos en los que luego de la administración de SECUFEM PLUS se presente un sangrado anormal previo a la fecha esperada de la menstruación, o si la misma se atrasara más de cinco días, deberá efectuarse un test de embarazo para descartar su presencia.

La utilización de SECUFEM PLUS no protege de la posibilidad de contraer SIDA o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual para lo cual la utilización del preservativo sigue siendo insustituible.

SECUFEM PLUS no debe administrarse en presencia de un embarazo extrauterino (embarazo ectópico) o salpingitis.

En caso de vómitos dentro de las tres horas siguientes a la toma del comprimido, debe tomarse otro comprimido inmediatamente.

La administración reiterada dentro de un ciclo menstrual está desaconsejada debido a la posibilidad de alteraciones en el ciclo.

Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

## Lactancia

En mujeres que reciben por tiempo prolongado anticonceptivos orales conteniendo sólo progestágenos, se encuentran pequeñas cantidades de estos en la leche materna. No obstante, no se han observado efectos adversos relacionados con la medicación sobre la lactancia en lo que respecta a calidad y cantidad de la leche materna, por lo cual no se ve afectado el desarrollo y el crecimiento del lactante.

Consulte a su médico previo a la utilización del producto.

## Conducción de vehículos o uso de máquinas:

Este medicamento no afecta la capacidad individual para conducir un vehículo o para utilizar máquinas. De todas maneras debe evitarse si se presentaran algunas de las manifestaciones señaladas en reacciones adversas.

## Interacciones:

Las asociaciones desaconsejadas son con inductores enzimáticos como anticonvulsivantes (Carbamazepina, Fenobarbital, Fenitoína, Primidona), Efavirenz, Ritonavir, hierba de San Juan, Acetato de Ulipristal, Ciclosporina, Griseofulvina, Rifabutina, Rifampicina.

## ¿Qué es la anticoncepción de emergencia?

Es un método utilizado inmediatamente después de una relación sexual no protegida para prevenir un embarazo.

## ¿Cuándo usar un anticonceptivo de emergencia?

Debe ser utilizado lo más rápidamente posible a más tardar dentro de las 72 horas (3 días) luego de la relación sexual sin protección, especialmente si:

- Tuvo una relación sexual mientras usted o la pareja no utilizaban un método anticonceptivo.
- Si olvidó tomar su píldora anticonceptiva más allá del tiempo máximo permitido: en este caso vuelva a leer el prospecto de su anticonceptivo oral.
- Si el preservativo de su pareja se rompió o si olvidó utilizarlo.
- Si tiene la impresión de que su dispositivo intrauterino (DIU) fue expulsado.
- Si su diafragma se movió o lo retiró demasiado pronto.
- Si se tiene un fracaso del método de coito interrupto o de otros métodos anticonceptivos naturales.
- En caso de violación.

## En todos los casos debe consultar con su médico.

## Reacciones adversas:

Los efectos no deseables que se han observado son:

- Náuseas, vómitos, vértigo, fatiga, cefalea, dolores abdominales, tensión mamaria, sangrado genital luego de la toma de los comprimidos.
- En cualquier caso, con estos u otros síntomas, es conveniente la consulta con el médico.

## Presentación:

Envase conteniendo 1 comprimido.

Conservar a temperatura ambiente (15-30)°C

En caso de intoxicación comunicarse con el C.I.A.T. Tel. (02)1722.

Mantener fuera del alcance de los niños.



URUFARMA S.A.

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: [depto\\_medico@urufarma.com.uy](mailto:depto_medico@urufarma.com.uy)

Pág. Web: [www.urufarma.com.uy](http://www.urufarma.com.uy)



0800 8133  
FonoMujer