

Sulatan

Aprepitant 80 mg / Aprepitant 125 mg



Urufarma

LI-7061-01

Fórmula:

Cada cápsula pequeña contiene: Aprepitant 80 mg y excipientes c.s.

Cada cápsula grande contiene: Aprepitant 125 mg y excipientes c.s.

Acción terapéutica:

Antiemético

Indicaciones:

Indicado en adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad, en combinación con otros medicamentos para evitar las náuseas y los vómitos provocados por algunos tratamientos de quimioterapia como: Cisplatino, Ciclofosfamida, Doxorubicina o Epirubicina.

Posología:

Sulatan se administra por vía oral, con o sin alimentos. Se debe tragar la cápsula entera.

Tomar siempre Sulatan junto con otros medicamentos para prevenir las náuseas y vómitos incluyendo corticosteroides (como Dexametasona) y un antagonista 5-HT₂ (como Ondansetrón)

El tratamiento recomendado es de 3 días. El primer día la dosis es de 1 cápsula de 125 mg (cápsula grande) 1 hora antes de empezar la sesión de quimioterapia. Los dos días siguientes; 1 cápsula de 80 mg (cápsula pequeña) cada día, 1 hora antes de comenzar la sesión de quimioterapia. Si no le están administrando quimioterapia, tome Sulatan por la mañana.

No se debe tomar más dosis de las indicadas por el médico. Consulte a su médico si se ha olvidado una dosis.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al Aprepitant o alguno de los demás componentes de este medicamento.

Pacientes que estén tomando medicamentos con Pimozida (utilizado para tratar enfermedades psiquiátricas), Terfenadina y Astemizol (utilizados para la rinitis alérgica y otros trastornos alérgicos), Cisaprida (utilizado para tratar problemas digestivos) deben de informar al médico ya que el tratamiento debe ser modificado antes de comenzar el tratamiento con Sulatan.

Precauciones y advertencias:

Informe a su médico si tiene una enfermedad del hígado, puede ser que sea necesario controlar su estado ya que el hígado es importante para eliminar el medicamento del cuerpo.

No administrar a niños menores de 12 años de edad, no se ha estudiado en esta población.

Embarazo: Consulte a su médico antes de comenzar el tratamiento si está embarazada, podría estar embarazada o si tiene intención de quedar embarazada, ya que no se debe utilizar este medicamento durante el embarazo a no ser que sea claramente necesario.

Lactancia: Se desconoce si Aprepitant pasa a la leche materna; por lo que no se recomienda dar el pecho durante el tratamiento con este medicamento. Informe a su médico antes de comenzar el tratamiento.

Conducción y uso de máquinas: Si se siente mareado o somnoliento, evite conducir, andar en bicicleta o usar máquinas o herramientas después de tomar este medicamento ya que se debe considerar que algunas personas tienen mareo y sueño después de tomar Aprepitant.

Interacciones medicamentosas:

- Pimozida, Terfenadina, Astemizol y Cisaprida: no deben tomarse con Aprepitant o requieren un ajuste en la dosis.
- Medicamentos anticonceptivos (anticonceptivos orales, parches cutáneos, implantes y ciertos dispositivos intrauterinos (DIUs) que liberan hormonas): durante el tratamiento con Aprepitant y hasta 2 meses después de terminar el tratamiento, debe utilizarse otro método de anticoncepción no hormonal ya que los medicamentos anticonceptivos hormonales pueden disminuir su eficacia si se toman junto con Aprepitant.

Consulte a su médico si toma alguno de los siguientes medicamentos que pueden ser afectados por el tratamiento de Aprepitant:

- Ciclosporina, Tacrolimus, Sirolimus, Everolimus (inmunosupresores),
- Alfentanilo, Fentanilo (usados para tratar el dolor),
- Quinidina (usado para tratar los latidos irregulares),

- Irinotecán, Etopósido, Vinorelbina, Ifosfamida (medicamentos usados para tratar el cáncer),
- Ergotamina o Diergotamina (alcaloides derivados del ergot), usados para tratar migrañas,
- Warfarina, Acenocumarol (diluyentes de la sangre; se pueden necesitar análisis de sangre),
- Rifampicina, Claritromicina, Telitromicina (antibióticos usados para tratar infecciones),
- Fenitoína (medicamento usado para tratar las convulsiones),
- Carbamazepina (usado para tratar la depresión y la epilepsia),
- Midazolam, Triazolam, Fenobarbital (medicamentos usados para tranquilizar o para ayudar a dormir),
- Hierba de San Juan (un preparado a base de plantas usado para tratar la depresión),
- inhibidores de la proteasa (usados para tratar infecciones por VIH),
- Ketoconazol, excepto Shampoo (usado para tratar el síndrome de Cushing - cuando el cuerpo produce un exceso de cortisol),
- Itraconazol, Voriconazol, Posaconazol (antifúngicos),
- Nefazodona (usado para tratar la depresión),
- corticosteroides (tales como Dexametasona y Metilprednisolona),
- medicamentos para la ansiedad (tales como Alprazolam),
- Tolbutamida (medicamento usado para tratar la diabetes)

Efectos secundarios:

Deje de tomar el medicamento y consulte a su médico frente a síntomas de reacción alérgica como: ronchas, sarpullido, picor, dificultad para respirar o tragar.

Los efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas) son: estreñimiento, indigestión, cefaleas, cansancio, pérdida de apetito, hipo, aumento de la cantidad de enzimas hepáticas en sangre.

Los efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas) son: mareo, somnolencia, acné, sarpullido, ansiedad, eructos, náuseas, vómitos, ardor de estómago, dolor de estómago, boca seca, flatulencias, aumento de la micción dolorosa, debilidad, malestar general, sofocos/enrojecimiento de la cara o de la piel, latidos rápidos o irregulares, fiebre con riesgo elevado de infección, disminución de los glóbulos rojos.

Los efectos adversos que pueden afectar raramente (1 de cada 1.000 personas) son: dificultad para pensar, falta de energía, alteración del gusto, sensibilidad de la piel al sol, sudor excesivo, piel grasa, llagas en la piel, erupción con picor, síndrome de Stevens-Johnson/necrosis epidérmica tóxica (reacción cutánea grave rara), euforia (sensación de felicidad extrema), desorientación, infección bacteriana, infección por hongos, estreñimiento intenso, úlcera de estómago, inflamación del intestino delgado y colon, llagas en la boca, hinchazón del vientre, frecuentes ganas de orinar, orinar más de lo normal, presencia de azúcar o sangre en la orina, molestias en el pecho, hinchazón, cambios en la manera de andar, tos, mucosidad en la parte de atrás de la garganta, irritación de la garganta, estornudos, dolor de garganta, secreción y picor oculares, zumbido de oídos, espasmos musculares, debilidad muscular, sed excesiva, latidos lentos, problemas de los vasos del corazón y de las venas, disminución de los glóbulos blancos, niveles bajos de sodio en la sangre, pérdida de peso.

Presentación:

Envase contenido 3 cápsulas (2 cápsulas pequeñas y 1 cápsula grande)

Conservar a temperatura ambiente (15-30)°C.

En caso de intoxicación comunicarse con el C.I.A.T. Tel.: (02)1722.

Mantener fuera del alcance de los niños.

URUFARMA S.A.

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Teléfono: 2487 24 24

E-mail: depto_medico@urufarma.com.uy

Pág. Web: www.urufarma.com.uy