

# Ibupirac 200

Ibuprofeno 200mg.



#### Fórmula:

Cada comprimido contiene: Ibuprofeno 200 mg y excipientes c.s.

**Acción Terapéutica:** Antipirético - Analgésico - Antiinflamatorio no esteroideo

**Indicaciones:** Síndromes febriles de diversa etiología. Dolores agudos: procesos inflamatorios, cefaleas, lumbo-ciática u otros síndromes radiculares. Dolores traumáticos y reumáticos. Neuralgias (incluida herpética). Mialgias. Gota aguda. Parotiditis. Otitis. Mastoiditis. Sinusitis. Odontalgias. Dismenorreas. Mastitis. Dolores post-parto. Tromboflebitis. Algias post-operatorias. Dolores crónicos: Lumbalgias. Artrosis. Poliartrosis crónicas. Dolores musculoesqueléticos crónicos. Algias neoplásicas. Periartritis escápulo humeral. Espondilitis anquilosante. Dolores articulares de las collagenopatías. Enfermedad de Paget.

**Posología y Modo de Administración:** Como dosis de inicio se sugiere 1 comprimido cada 6-8 horas.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al Ibuprofeno. Embarazo. Lactancia. Úlcera gastroduodenal severa o en actividad.

**Efectos Secundarios:** Raramente pueden aparecer náuseas, ligera dispepsia, dolor epigástrico, diarrea. En estudios comparativos con Ácido acetil salicílico e Indometacina, se ha demostrado que a igualdad de dosis efectivas, la incidencia de efectos adversos gastrointestinales disminuye a la mitad en pacientes tratados con Ibuprofeno.

**Precauciones y Advertencias:** Administrar con precaución a pacientes con asma bronquial o broncoespasmo. Los AINEs deben ser administrados con precaución a pacientes con antecedentes de úlcera o hemorragia gastrointestinal. Se debe tener precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca, coronariopatía, arritmias cardíacas y durante el uso simultáneo con antihipertensivos. Se deben evitar los tratamientos prolongados.

**Interacciones Medicamentosas:** Anticoagulantes orales y Heparina: puede aumentar el riesgo de hemorragia. Litio: El Ibuprofeno puede producir una elevación de los niveles plasmáticos de Litio así como una reducción en su depuración renal. Diuréticos: En algunos pacientes el Ibuprofeno puede reducir el efecto natriurético de la Furosemida y de las Tiazidas. Antiinflamatorios no esteroideos: pueden aumentar los potenciales efectos adversos propios de esta clase de medicamentos.

**Presentación:** Envases conteniendo 5 y 10 comprimidos.

Conservar a temperatura ambiente, entre (15 - 30) C.°

Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas consulte a su médico.

En caso de intoxicación comunicarse con el CIAT. Tel. (02)1722

**Mantener fuera del alcance de los niños.**



IBUPIRAC 400 VER



IBUPIRAC 600 VER



IBUPIRAC 800 VER



**URUFARMA S.A.**

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: [depto\\_medico@urufarma.com.uy](mailto:depto_medico@urufarma.com.uy)

Pág. Web: [www.urufarma.com.uy](http://www.urufarma.com.uy)