

# Ibupirac Fast 600

Ibuprofeno 600mg. Excipientes c.s.



#### Fórmula:

IBUPIRAC FAST 400 Cada cápsula blanda contiene: Ibuprofeno 400 mg y excipientes c.s.

IBUPIRAC FAST 600 Cada cápsula blanda contiene: Ibuprofeno 600 mg y excipientes c.s.

**Acción Terapéutica:** Antipirético - analgésico - antiinflamatorio no esteroideo.

**Indicaciones:** Síndromes febriles de diversa etiología. Dolores agudos: procesos inflamatorios, cefaleas, lumbociática u otros síndromes radiculares. Dolores traumáticos y reumáticos. Neuralgias (incluida herpética). Mialgias. Gota aguda. Parotiditis. Otitis. Mastoiditis. Sinusitis. Odontalgias. Dismenorreas. Mastitis. Dolores post-parto. Tromboflebitis. Algias post-operatorias. Dolores crónicos: Lumbalgias. Artrosis. Poliartritis crónicas. Dolores musculoesqueléticos crónicos. Algias neoplásicas. Periartritis escapulo humeral. Espondilitis anquilosante. Discopatías. Dolores articulares de las colagenopatías. Enfermedad de Paget.

**Posología:** Como dosis de orientación se sugiere una cápsula blanda cada 6-8 horas según criterio médico; dependiendo del cuadro clínico y de la intensidad de los síntomas.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al Ibuprofeno. Embarazo. Lactancia. Úlcera gastroduodenal severa o en actividad.

**Efectos Secundarios:** Raramente pueden aparecer náuseas, ligera dispepsia, dolor epigástrico, diarrea. En estudios comparativos con Ácido acetil salicílico e Indometacina, se ha demostrado que a igualdad de dosis efectivas, la incidencia de efectos adversos gastrointestinales disminuye a la mitad en pacientes tratados con Ibuprofeno.

**Precauciones y Advertencias:** Administrar con precaución a pacientes con asma bronquial o broncoespasmo. Los AINEs deben ser administrados con precaución a pacientes con antecedentes de úlcera o hemorragia gastrointestinal. Se debe tener precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca, coronariopatía, arritmias cardíacas y durante el uso simultáneo con antihipertensivos. Se deben evitar los tratamientos prolongados. Raramente se pueden presentar reacciones alérgicas cruzadas con Ácido acetil salicílico u otros AINE's.

**Interacciones Medicamentosas:** *Anticoagulantes orales y Heparina:* podrían aumentar el riesgo de hemorragia. *Litio:* el Ibuprofeno puede producir una elevación de los niveles plasmáticos de Litio así como una reducción en su depuración renal. *Diuréticos:* en algunos pacientes el Ibuprofeno puede reducir el efecto natriurético de la Furosemida y de las Tiazidas. *Antiinflamatorios no esteroideos:* pueden aumentar los potenciales efectos adversos propios de esta clase de medicamentos.

**Presentación:** Ibupirac Fast 400: Envases conteniendo 10 cápsulas blandas.

Ibupirac Fast 600: Envases conteniendo 10 cápsulas blandas.

Conservar a temperatura ambiente (15-30) °C

En caso de intoxicación comunicarse con el C.I.A.T. Tel.: (02) 1722.

Mantener fuera del alcance de los niños.



IBUPIRAC FAST 200 VER



IBUPIRAC FAST 400 VER



**URUFARMA S.A.**

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: [depto\\_medico@urufarma.com.uy](mailto:depto_medico@urufarma.com.uy)

Pág. Web: [www.urufarma.com.uy](http://www.urufarma.com.uy)