

FLODIN-D-NF

COMPRIMIDOS



PharmaNova

LI - 5210-02



FÓRMULA

Cada tableta contiene:

Loratadina 10 mg

Dexametasona 2 mg

Excipientes..... c.s.

ACCION TERAPEUTICA

FLODIN - D - NF ejerce una acción anti-alérgica inmediata y de acción sostenida, mediante la adecuada combinación de los efectos terapéuticos de sus dos componentes: La Loratadina bloquea la producción y la liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienos por parte de los mastocitos y basófilos sensibilizados por IgE, característica de las reacciones alérgicas. La Loratadina también bloquea los receptores H1 periféricos, anulando o reduciendo la respuesta alérgica a nivel de los órganos efectores: piel, mucosas, etc. Dexametasona previene y suprime el desarrollo de la inflamación, así como las manifestaciones posteriores a la misma: edema, depósito de fibrina, dilatación capilar, etc. Administrada en una dosis matinal única, suprime la alergia aguda, sumando un pico plasmático al fisiológico, sin interferir con el ritmo de la secreción natural de la glándula suprarrenal.

INDICACIONES

Reacciones alérgicas agudas, tales como urticaria, rinitis estacional, fiebre del heno, conjuntivitis alérgica, alergia a los medicamentos, etc.

Reacciones alérgicas crónicas, tales como rinitis perenne, urticaria crónica, eczema, dermatitis por contacto, asma extrínseca, etc.

POSOLOGIA

1 tableta por día. Nota: A diferencia de otros antihistamínicos, FLODIN - D - NF no potencia la acción de depresores del S.N.C. como hipnóticos, sedantes, alcohol, etc. Administrado en dosis terapéuticas, no interfiere con el desarrollo de actividades, como conducir vehículos o manejar maquinarias.

EFFECTOS COLATERALES Y SECUNDARIOS

El empleo de corticoides en dosis elevadas y por períodos prolongados puede producir: edemas, aumento de peso, hipocalcemia. También puede provocar trastornos gastrointestinales: ardor y dolor epigástrico.

ADVERTENCIAS

La supresión del medicamento debe hacerse en forma gradual. Cuando la administración es prolongada se harán controles hematológicos.

CONTRAINDICACIONES

- a) Tuberculosis activa a menos que se utilicen quimioterápicos específicos.
- b) Insuficiencia cardíaca congestiva
- c) Hipertensión arterial grave
- d) Úlcera gastroduodenal La experiencia actual no permite establecer la inocuidad de su uso durante el embarazo, por lo tanto sólo deberá utilizarse cuando a criterio del médico el beneficio supere los riesgos posibles.

PRESENTACION

Envase conteniendo 10 tabletas.

Conservar a temperatura ambiente.

Mantener fuera del alcance de los niños.



FLODIN-NF VER



PharmaNova

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: depto_medico@urufarma.com.uy

PharmaNova Pág. Web: www.urufarma.com.uy