

# FLODIN NF

■ COMPRIMIDOS



PharmaNova

LI - 5213-04



## FÓRMULA

FLODIN-NF comprimidos: Cada comprimido contiene 10 mg de Loratadina y excipientes c.s.

## PROPIEDADES:

Loratadina es un antihistamínico ultra-selectivo de los receptores periféricos H1 que desarrolla una acción rápida y prolongada. Los estudios de inhibición de la pápula de histamina en el hombre han mostrado que una dosis única de 10 mg de Loratadina ejerce una actividad anti-histamínica a partir de la segunda hora. A las 12 horas, la pápula presenta una disminución del 70%. Luego de tratamientos prolongados con Loratadina no se observa la aparición de taquifilaxia. La incidencia de sedación es igual a la observada con el placebo. En lo referente a sus acciones sobre el sistema nervioso central, los estudios especiales practicados, tales como exámenes reiterados de latencia para el adormecimiento, estudios sobre la conducción de automóviles así como la habilidad psicomotriz, no han mostrado diferencias significativas entre 10 mg de Loratadina y el placebo. Así mismo, se ha demostrado la ausencia de interferencia entre Loratadina, el alcohol y el Diazepam. Loratadina carece de acción anti-colinérgica.

## MECANISMO DE ACCIÓN

Se considera que Loratadina bloquea la producción y la liberación de Histamina, prostaglandinas y leucotrienos por parte de los mastocitos y basófilos sensibilizados por IgE, característica de las reacciones alérgicas. Loratadina también bloquea los receptores H1 periféricos, anulando o reduciendo la respuesta alérgica a nivel de los órganos efectores: piel, mucosas, etc.

## FARMACOCINÉTICA

Loratadina se absorbe rápidamente por vía oral; sus concentraciones plasmáticas máximas se presentan a la hora, descendiendo luego de modo bifásico. Loratadina sufre un intenso efecto de primer pasaje hepático. Se une fuertemente con proteínas del plasma. La eliminación urinaria y fecal es del orden del 80% en 10 días. La insuficiencia renal no modifica significativamente los parámetros farmacocinéticos de Loratadina.

## INDICACIONES

Tratamiento sintomático de las afecciones alérgicas: rinitis estacional, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, urticaria crónica, dermatitis de contacto, dermatosis alérgica, picadura de insectos, polinosis, componente alérgico de las infecciones de las vías respiratorias superiores.

## CONTRAINDICACIONES

Sensibilidad a la Loratadina.

## PRECAUCIONES

Se desaconseja su empleo durante el embarazo y la lactancia. La seguridad y eficacia de Loratadina no ha sido evaluada en niños menores de 2 años de edad.

## EFECTOS SECUNDARIOS

Son excepcionales. Puede aparecer como sequedad de boca, fatiga, somnolencia, cefalea. La frecuencia de su aparición es comparable a la observada con el placebo.

## POSOLOGÍA

Adultos y niños de más de 30 kg de peso: 1 comprimido (10 mg) de FLODIN-NF una vez al día.

## PRESENTACIONES

Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos.

Conservar a temperatura ambiente (15 - 30 °C).

En caso de sobredosificación comunicarse con el CIAT. Tel.: (02) 1722 (Emergencias), 487 40 00 - 481 21 11. Hospital de Clínicas p.7.

**Mantener fuera del alcance de los niños.**



**FLODIN-D-NF VER**



**PharmaNova**

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: [depto\\_medico@urufarma.com.uy](mailto:depto_medico@urufarma.com.uy)

PharmaNova Pág. Web: [www.urufarma.com.uy](http://www.urufarma.com.uy)