

# Novidat 500 mg

Ciprofloxacina 500 mg



## Fórmula:

**NOVIDAT 500 mg:** cada comprimido recubierto contiene: Ciprofloxacina (como clorhidrato) 500 mg y excipientes c.s

## Acción terapéutica:

Antibiótico bactericida de amplio espectro perteneciente a las quinolonas de 3ª generación. Ejerce su acción por inhibición selectiva de la ADN - girasa bacteriana interfiriendo en la replicación del ADN. Su espectro de acción abarca una amplia variedad de gérmenes gram-positivos y gram-negativos, aerobios y anaerobios.

La acción bactericida de NOVIDAT (Ciprofloxacina) se obtiene rápidamente, lográndose concentraciones séricas y tisulares muy por encima de las Concentraciones Inhibitorias Mínimas.

Los microorganismos resistentes a otros antibióticos, tales como penicilinas, cefalosporinas, y aminoglucósidos, se mostraron generalmente sensibles a Ciprofloxacina. La gran actividad y el amplio espectro antibacteriano (incluso en infecciones a pseudomonas) de Ciprofloxacina hace posible, la mayoría de las veces, administrarlo sin necesidad de asociarlo a otros antibióticos.

## Indicaciones y posología:

Según criterio médico, de acuerdo a la índole o gravedad de la infección.

El rango de dosis para adultos es de 250 mg - 750 mg dos veces al día, según la gravedad y tipo de infección, sensibilidad del organismo causal y edad, peso y función renal del paciente.

## Se sugiere en:

- Infecciones del tracto urinario inferior y superior: 250 - 500 mg dos veces al día, según la gravedad.
- Gonorrea: una sola dosis de 250 mg.
- Infecciones de vías respiratorias: 250 - 750 mg dos veces al día, tanto en infecciones de tracto inferior como superior, según la gravedad.
- Infecciones ósteo-articulares, infecciones intestinales: 500 - 750 mg dos veces por día según la gravedad.
- En la mayoría de las infecciones - O.R.L., urogenitales, cutáneas, pelvianas y ginecológicas: 500- 750 mg dos veces por día, según la gravedad.
- Pacientes con función renal limitada: con un clearance de creatinina inferior a 20 mL/min., se debe administrar la mitad de la dosis normal, en una o dos tomas diarias.

Las tomas pueden realizarse independientemente de las comidas. La ingestión en ayunas acelera la absorción. La duración del tratamiento depende de la gravedad del caso y de la evolución clínica y bacteriológica del mismo. En infecciones agudas el término medio es de 5 a 10 días. El tratamiento debe continuarse durante 3 días después de haber cedido la fiebre, o luego de la desaparición de los síntomas clínicos.

## Efectos secundarios:

Ocasionalmente pueden presentarse: náuseas, vómitos, cefaleas o mareos, así como aumento de las transaminasas hepáticas.

**Interacciones medicamentosas:**

La administración de Ciprofloxacina (1.500 mg y más al día) y Teofilina puede producir un aumento no deseado en las concentraciones plasmáticas de Teofilina.

Los antiácidos con hidróxido de Aluminio o de Magnesio disminuyen la absorción de Ciprofloxacina, por lo que se recomienda evitar la administración simultánea con estos preparados, aconsejándose un intervalo de 2 horas entre una ingesta y otra.

**Advertencias:**

La Ciprofloxacina deberá administrarse con precaución en pacientes con antecedentes de accesos convulsivos, siendo conveniente asegurar un tratamiento anticonvulsivo adecuado.

No se recomienda su uso durante el embarazo y lactancia.

**Adolescentes y niños:** Como otros fármacos de este tipo, en los animales inmaduros, puede causar artropatía en las niñas y adolescentes en crecimiento. Sin embargo, cuando el beneficio del empleo de Ciprofloxacina se considera infección y del peso del paciente, repartidos en dos dosis.

**Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad a la droga.

**Presentación:**

**NOVIDAT 500 mg:** Envases conteniendo 10 comprimidos recubiertos.

Conservar a temperatura ambiente (15 - 30)°C

En caso de sobredosificación comunicarse con el C.I.A.T. Tel.(02) 1722

**Mantener fuera del alcance de los niños.**



**URUFARMA S.A.**

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: [depto\\_medico@urufarma.com.uy](mailto:depto_medico@urufarma.com.uy)

Pág. Web: [www.urufarma.com.uy](http://www.urufarma.com.uy)