

# OXA B<sub>12</sub>

Comprimidos - Inyectable



Urufarma

LI-4793-04

## Fórmula:

**OXA B<sub>12</sub>** Comprimidos recubiertos Cada comprimido contiene: Betametasona 0,3 mg; Cianocobalamina 5000 mcg, Diclofenac Potásico 50,0 mg y excipientes c.s.

**OXA B<sub>12</sub>** inyectable. Cada frasco ampolla liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 10000 mcg y excipientes c.s.

Cada ampolla contiene: Betametasona (como 21 fosfato disódico) 2 mg; Diclofenac Potásico 75 mg y excipientes c.s.p. 3 mL.

## Propiedades

**OXA B<sub>12</sub>** es una asociación constituida por Diclofenac, Betametasona y Vitamina B12 destinada al tratamiento de las afecciones dolorosas e inflamatorias con componente neurítico y artropatías agudas y/o crónicas. El Diclofenac Potásico es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo con excelentes propiedades antirreumáticas, analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas debidas a su acción inhibitoria de la síntesis de prostaglandinas. La Betametasona es una droga antiinflamatoria por excelencia que tiene la propiedad de inhibir todo tipo de inflamación. La Vitamina B12 interviene en una serie de procesos metabólicos de gran valor en el mecanismo de conducción nerviosa y es por lo tanto de utilidad excepcional en el tratamiento de neuritis y en otros tipos de procesos inflamatorios articulares.

**Indicaciones:** Afecciones neuríticas de origen traumático. -Radiculitis, Neuralgias, Lumbociatalgias y Cervicobraquialgias. -Dolor músculo esqueléticos y reumáticos extraarticulares. -Periartritis escápulo humeral, Tenosinovitis, Miositis y Bursitis, Epicondilitis, Tortícolis, Esguinces. -Patologías del deportista y Patologías laborales, Fibrositis.

## Posología

**OXA B<sub>12</sub>** Comprimidos recubiertos 1 comprimido cada 8 o 12 horas según criterio médico, administrados preferentemente después de las comidas.

**OXA B<sub>12</sub>** Inyectable 1 o 2 frascos ampolla por día, exclusivamente por vía intramuscular profunda.

**Reacciones secundarias:** En los comprimidos ocasionalmente puede aparecer epigastralgia, náuseas y vómitos. En el inyectable puede aparecer dolor en el sitio de inyección.

## Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los principios activos. Úlcera gastroduodenal activa, hipertensión arterial severa, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia hepática o renal graves, tuberculosis activa. La experiencia actual no permite establecer la inocuidad de su uso durante el embarazo, por lo tanto sólo deberá utilizarse cuando a criterio del médico el beneficio supere los riesgos posibles.

## Precauciones y advertencias

Usar con precaución en pacientes con antecedentes de hemorragia digestiva, úlcera gastroduodenal, hipertensión arterial, hipercorticismo, infecciones bacterianas crónicas, micosis sistémicas, diabetes, herpes zoster y otras virosis cutáneas. En tratamientos prolongados debe controlarse el hemograma, el metabolismo óseo y la función suprarrenal. Se deberá evitar su empleo en pacientes con glaucoma, cataratas o con artritis sépticas.

## Presentaciones

**OXA B<sub>12</sub>** comprimidos recubiertos: Envase conteniendo 10 comprimidos recubiertos.

**OXA B<sub>12</sub>** inyectable: Envase conteniendo 3 frascos ampolla liofilizado + 3 ampollas.

**Nota:** Para reconstituir el liofilizado usar únicamente el contenido de la ampolla que se adjunta.

Conservar a temperatura ambiente.

En caso de sobredosificación comunicarse con el CIAT. Tel.: (02)1722.

Mantener fuera del alcance de los niños.



**OXA B<sub>12</sub> Comprimidos** [VER](#)



URUFARMA S.A.

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: [depto\\_medico@urufarma.com.uy](mailto:depto_medico@urufarma.com.uy)

Pág. Web: [www.urufarma.com.uy](http://www.urufarma.com.uy)